
 <p>Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite</p>	 <b>OPĆA BOLNICA BJELOVAR</b>	<b>SOPK 3</b> <b>ANEST- RU -001-00</b>
	<b>Odjel anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i centralne sterilizacije</b>	Datum: 7.11.2022.
	<b>UPUTE ZA PRIJEOPERACIJSKI PREGLED</b>	Stranica 2/2

## UPUTE ZA BOLESNIKE

**Uzimanje hrane i tekućine prije operacijskog zahvata:**

- ništa na usta 2h prije zahvata
- ne uzimati krutu hranu najmanje 6 sati prije operacijskog zahvata ili dijagnostičko terapijskog postupka, a masnu i prženu hranu ne uzimati najmanje 8 sati prije operacijskog zahvata ili dijagnostičko terapijskog postupka.
- Ustezanje od pušenja 6-8 tjedana prije zahvata, od konzumiranja alkohola, uzimanja stimulacijskih sredstava.
- Najmanje 24 h nakon opće anestezije ne upravljati motornim vozilima. Pri tome nije važno kako se osjećate. Vaši refleksi mogu biti usporeni, a sposobnost odlučivanja smanjena.

**Ponijeti na pregled svu medicinsku dokumentaciju, popis i doze lijekova, podatke o implantiranim srčanim uređajima.**

## UPUTE ZA LIJEČNIKE

**Odgoda** elektivnog operacijskog zahvata:

- nakon CABG 6 tjedana, idealno 3 mjeseca
- nakon ugradnje BMS (bare metal stent) 4 tjedna, idealno 3 mjeseca
- nakon ugradnje DES (drug eluting stent) 12 mjeseci, nakon ugradnje stenata druge i treće generacije (zoltralimus, everolimus) 6 mjeseci
- nakon PCI 2-4 tjedna
- u slučaju akutnih respiratornih, novonastalih ili dekompenziranih kroničnih bolesti, sve do dva tjedana po izlječenju ili stabilizaciji stanja zbog kojeg je zahvat odgođen
- u slučaju cijepljenja živim uzročnikom 14 dana, a u slučaju cijepljenja mrtvim uzročnikom 3 dana.
- u slučaju infekcije Sars cov 2 virusom- asimptomatski 4 tjedna, srednje teški 6 tjedana, teški oblik 8 tjedana

*Dodatne informacije o klasifikaciji rizika operativnog zahvata, ev. diferentnijoj obradi kao i o ukidanju antikoagulacijske/antiagregacijske terapije mogu se naći na web stranici ustanove.*